



葡萄春季萌芽前管理要点

春季，随气温及地温的回升，葡萄由休眠期逐步进入芽膨大至绒球期。该时间段内主要进行的工作有田间整理、施萌芽肥、浇萌芽水、清园等。

1、田间整理

对田间沟渠、排灌系统进行检查修整，确保后续能及时补充萌芽水；整理田间支架（水泥柱、竹木架、钢架等），固定葡萄枝蔓，便于田间管理；结果枝组尽量平放以缓和顶端优势，利于提高后续萌芽整齐度；对田间枯枝落叶及时清理，清洁地块。

2、施萌芽肥

萌芽肥一般在萌芽前 10 天左右，芽膨大（芽鳞开始松动）时开浅沟或滴灌施入。主要以促进根系活动、萌芽整齐，为新梢生长提供营养为要点选择养分配比科学的套餐施入。一般推荐使用根宝 2 千克或根壮多 2~5 千克每亩，加施它或施特优水溶肥 3~6 千克每亩；对养分需求量较大的品种（如红地球）、需要进行无核化处理的巨峰或枝

干相对瘦弱的果园每亩可适当增加松尔肥 10~25 千克；而对于树势较旺的品种（如克瑞森）或采果肥施入量较足的果园，建议仅以根宝促根即可。

此外，为促进萌芽整齐度，可以在正常萌芽前 15 天左右开始全枝干喷施“优丰+稀施美”套餐，至萌芽时使用 1~2 次，每次间隔 7 天左右，为芽眼萌动提供生长动力，促进萌芽整齐。

3、浇萌芽水

萌芽前应及时浇萌芽水，根据土壤湿度灵活确定浇水量，整体以浇透且不积水为度。春季气温回升快而地温回升慢，需防止因浇水过多而阻碍地温回升，影响根系活动，甚至沤根；对于长势旺盛的品种（如克瑞森），更应适当控制浇水量（如田间土壤湿润，甚至可不浇水），防止浇水过多引发树体疯长，从而影响花芽继续分化。

4、春季清园

葡萄进入绒球期后，在见绿前全园喷施石硫合剂、矿物油或辛菌胺醋酸盐进行消毒杀菌处理；以降低园内越冬病虫源，减少后续病虫害发生概率。

清园时间的选择较为重要，在绒球期至萌芽期内，清园时间过早效果不理想（气温相对较低，对病虫源杀灭效果差），清园时间越接近见绿（萌芽）效果越好，但风险越高（因清园时使用药剂浓度相对较高，时间过迟容易对幼嫩组织产生灼烧）。具体使用应根据栽培品种的耐药性、气候状况等灵活选择时机。

温馨提示：因葡萄品种因素、气候条件、生长环境及栽培管理方式等

不同，对葡萄栽培管理都会造成一定的影响，以上介绍的管理要点及操作方式方法，仅供参考。要想种好葡萄，必须结合自己的果园灵活调整相应的栽培管理措施。国光致力于服务广大葡萄种植者，如有疑问，请来电交流探讨。

